

Målvärden 12 månader efter hjärtinfarkt, enligt SEPHIA 2010

* Rökstopp

* Blodtryck under 140

* LDL under 2.5

* Fysisk träning

Endast 2 av 10 patienter (18 %) under 75 år
när alla målvärden. (2009=19%, 2008=20 %)

Deltagande i rehabprogram på sjukhuset

- Andelen hjärtpatienter som deltagit i sjukhusets träningsgrupp år 2010 var 31 procent
- År 2009 var andelen 38 procent

Varför så lågt deltagande i sjukhusets rehabprogram och varför minskar andelen som deltar?

- Mot den bakgrunden bestämde sig Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2010, att genomföra en studie för att ta reda på svaret

SPICI – STUDIEN

(Study of Patient Information after Coronary Intervention)

Syfte

- Undersöka hur patienter som behandlats med ballongvidgning (PCI) uppfattar informationen de får på sjukhuset.
- Vad patienterna tror har orsakat sjukdomen
- Hur patienterna ser på livsstilsförändringar

Metod

- Tillsättning av forskargrupp
- Utforma en enkät
- Bjuda in 29 sjukhus att delta i studien
- Sköterskor delar ut enkäten till patienten vid återbesök, 6-8 veckor efter PCI
- Patienterna fyller i enkäten hemma och skickar in den anonymt till riksförbundet

Forskargruppen

- Professor Joep Perk, Linnéuniversitetet
- Professor Jan Lisspers, Mittuniversitetet
- Docent Kristina Hambreaus, Falu lasarett
- Docent Roland Carlsson, Svensk PCI
- Docent Gunilla Burell, Uppsala Universitet
- Forskningspartner: Britt Bergh, Ingrid Allermo
- Projektledare Pelle Johansson, Riksförbundet